

SORTENRATGEBER SOJABOHNEN

(geordnet nach Reife)

Sorte	zugelassen seit ...	Reifegruppe	Reife (1 = sehr früh)	Jugendentwicklung (1 = sehr gut)	Standfestigkeit (1 = sehr gut)	Nabelfarbe (H = hell, D = dunkel)	Tausendkornmasse (1 = sehr hoch)	Rohproteingehalt	Rel.-Kornträge LSV 2010-2014 Großraum B-W, R-P, HE 100 = 31,0 dt/ha	Hinweise
Merlin	1997	000	2	2	5	D	7	O	97	robust, für kühlere Lagen
Gallec	2003	000	2	3	5	H	3	+	(99)	
Lissabon	2008	000	3	4	3	H	4	O	104	
Amandine	2012	000	3	3	5	H	5	+	99	Lebensmitteleignung
Sultana	2009	000	3	4	3	D	2	++	103	nicht für trockenste Lagen
Aligator	2008	000	3	5	3	D	3	O	100	
Solena	2012	000/00	4	3	5	D	3	+	108	für trockenere Lagen
SY Livius	2013	000/00	4	4	3	H	2	++	105	
Tourmaline	2013	000/00	4	3	5	D	4	O	107	für trockenere Lagen
Opaline	2009	000/00	4	4	6	D	3	O	110	für trockenere Lagen
Pollux	2012	000/00	(4)	(4)	(6)	H	(5)	+	110	für trockenere Lagen
SY Eliot	2013	00	5	4	4	H	2	O	112	
Korus	2011	00	5	4	2	H	4	++	106	Tofueignung
Primus	2005	00	5	4	3	H	1	+++	100	Tofueignung
Naya	2010	00	6	4	2	H	2	+	104	
ES Mentor	2009	00	7	5	2	H	3	++	116	empfindl. gegen Metribuzin
Flavia	2010	00	7	4	4	H	4	-	110	
Sinara	2009	00	7	4	4	D	1	-	111	
Silvia PZO	2012	00	8	3	4	D	4	--	116	nur wärmste, trockene Orte

Reifegruppen: 000 = sehr früh, 00 = früh (nur für Rheintal und Weinbauklima) (123) = älteres Ergebnis bzw. andere Bonitur
 Quellen: Versuchsergebnisse: LTZ Augustenberg (B-W,R-P, HE Süd) Bonituren: Beschreibende Sortenliste Österreich 2014